

استخدام أداة ريتشديك (ReachDeck) لترجمة المعلومات على هذا الموقع الإلكتروني إلى لغات أخرى
يستخدم موقعنا الإلكتروني أداة تسمى ريتشديك (ReachDeck) (لقراءة النصوص بصوت عالي وترجمتها)
يمكنها أن تترجم المعلومات على الموقع الإلكتروني إلى عدة لغات. كما يمكنها نطق النص المترجم ببعض اللغات.
يبدو شريط أدوات ReachDeck هكذا، ويوجد على الصفحة الرئيسية (قد يبدو مختلفًا عند عرضه على هاتف جوال).



يشرح رمز "المساعدة" إعدادات شريط الأدوات

لترجمة صفحاتنا الإلكترونية:

	1. انقر على رمز ReachDeck (عادةً أعلى يمين الشاشة).
	2. سيظهر شريط أدوات ReachDeck
	3. انقر على رمز الترجمة translation وحدد اللغة من القائمة المنسدلة
	4. إذا كان خيار "التمرير للتحدث" 'hover to speak' متاحًا للغتك، ستكون قادرًا على تحديد هذا الرمز واستخدام الفأرة لتحديد النص المراد قراءته بصوت عالي (إذا كان غير متاح، سيظهر الرمز باهتًا). لوقف القراءة بصوت عالي، قم بإلغاء تحديد رمز "التمرير للتحدث" 'hover to speak'.
	5. لوقف الترجمة، حدد رمز "التوقف" stop. في حال استخدام خيار "التمرير للتحدث" 'hover to speak'، قم بإلغاء تحديده قبل العودة إلى الإنجليزية بقائمة الترجمة، ثم اغلق شريط الأداة.

لترجمة ملف بصيغة بي دي إف:

	1. انقر على رمز ReachDeck (عادةً أعلى يمين الشاشة).
	2. سيظهر شريط أدوات ReachDeck
	3. انقر على رمز الترجمة translation وحدد لغة من القائمة المنسدلة
	4. افتح ملف البي دي إف الذي تريد ترجمته. قد يكون على صفحة نشرات المعلومات للمرضى أو قائمة النشرات لصفحة خدمة.

	5. سيظهر النص المترجم أعلى النص الإنجليزي (انظر الصورة أدناه)
	6. لطباعة النص المترجم، حدد النص وانسخه (ctrl+C) ثم الصقه (ctrl+V) في مستند على وورد. قد تحتاج إلى نسخ الترجمة جزء جزء للحفاظ على الترتيب الصحيح للنص.
	7. لوقف الترجمة، حدد رمز "التوقف" stop. عند استخدام خيار "التمرير للتحدث" 'hover to speak'، قم بإلغاء تحديده قبل العودة إلى الإنجليزية على قائمة الترجمة، ثم اغلق شريط الأداة.

ud.com/PDFViewer/_Desktop/viewer.aspx?file=https://pdf.browsealoud.com/StreamingProxy.ashx?url=https://www.royalberkshire.nhs.uk/media/ai2faedq/ac

Yahoo Mail BBC News News, sport and opi... Apps | Adobe Creati... Umbraco log in Login - eProcurement eConsent log in QR Code Gen

ReachDeck

Допомагає вашим ранам зажити
Зменшіть або припиніть палити принаймні на 2 тижні до і 2 тижні після операції.
Куріння зменшує кількість кисню /gen переноситься кров'ю і викликає звуження кровоносних судин. Це також послаблює імунної системи, збільшуючи ризик інфекція.

Відпустка після операції /
Це залежатиме від того, де на вашому тілі ви перенесли операцію та що передбачає ваша робота. Про це вам може порадити ваш консультант.

Водіння
Ваша здатність керувати автомобілем після операції буде залежать від місця розташування рани та поради, надані вашим хірургом.
Розгляньте можливість поговорити зі своєю страховкою компанії, перш ніж продовжити водіння.

Речі, на які варто звернути увагу
Якщо ваша рана почервоніла, опухла або більш болючим, це може бути ознакою того, що є це проблема. Зв'яжіться з нами або своїм лікарем загальної практики за порадою.

Подальша інформація
Відвідайте Британську асоціацію пластику Реконструктивні та естетичні хірурги веб-сайт www.bapras.org.uk/public/patient-інформації

Зв'яжіться з нами
Клінічна пластична та реконструктивна хірургія
Команда адміністратора (CAT 1): rbbh.CAT1@nhs.net
Королівська Беркширська лікарня
0118 322 7139
Громадська лікарня Західного Беркшира
01635 273390

Щоб дізнатися більше про нашу довіру, відвідайте
www.royalberkshire.nhs.uk

Будь ласка, запитайте, чи потрібно вам це
інформацію іншою мовою або формат.

Пластична та реконструктивна хірургія RBFT,
Переглянуто: грудень 2023 р
Термін наступного перегляду: Грудень 2025

Порада наступна
пряме закриття рана (рана зі швами)

Інформація для пацієнтів
які мали пластику і реконструктивна хірургія

Перекладати
українська мова - Ukrainian